

התא



מאפייני החיים

הערות/הסבירים	מוניינים ומושגים נוספים	מפורט תכניות	רעיון / תופעה
<p>יש לציין כי מאפייני החיים המאפיינים כל תא מאפיינים גם ארגניזום שלם רב תא.</p> <p>חשיבות היחס בין שטח הפנים לנפח תודגש בהקשר לגודל התא ולמבנה חלק מהאברונים.</p> <p>יש לציין כי הנגיפים הם קבוצה ייחודית של טיפולים, בעלי מבנה בסיסי של מעטפת וחומר תורשתי - DNA או RNA - שאינם מסוגלים להתרבות בעצמם.</p> <p>יש להציג את ההבדל העיקרי בין נגיפים שהם טיפולים מוחלטים, שלא מתקיים בהם חילוף חומרים, הם תלויים בתא המאכسن, ומסוגלים להתרבות רק בתאי ארגניזמים אחרים, לבין חידתיים שהם ארגניזמים עצמאיים.</p>	<p>תא בעל חיים, תא חידק, תא צמח, גרעין התא, דופן התא, חיליות, לייזומים, מייטוכנדירה, פלסティדות, цитופלזמה, קרום התא, ריבוזומים, שלד תוך תא.</p>	<p>מאפייני החיים ומבנה התא - מבט על המבנה</p> <ul style="list-style-type: none"> הפרדה מהסבירה החיצונית, סביבה פנימית יציבה, חילוף חומרים (מטבוליזם), התרבות, תגובה לגירוי, גידלה והתקחות מאפיינים תאים. <p>תאים פרוקריוטיים ותאים אאוקריוטיים - מאפיינים אברוני התא ותפקידם</p> <ul style="list-style-type: none"> סוג תא ביצור רב תא: דמיון, שונות, התאמאה בין מבנה לתפקיד נגיפים (וירוסים) חידקים 	<p>התא הוא יחידת המבנה והתפקיד ביצורים החיים. בכל היצורים ניכרת אחידות רבה במבנה הבסיסי של התאים, בהרכב שלהם ובתהליכי היסוד המתקיים בהם, לצד שונות בצורה ובתפקיד.</p>

הגדרת מושג החיים והאבחנה בין גופים חיים לדוממים סקרנו מואז ומתרميد את החשיבה האנושית. מדוע רגע אחד מוגדר אדם כחי ורגע לאחר מכן אובדת לו "יכולת החיים"? מדוע צמח מוגדר כיצור חי ואילו אש המפוזרת ומתרפשות למקומות חדשים אינה כזו?

איש לא יחשוד באבן הנחה בשדה כיצור חי. המבנה הקבוע, דומיננטיות השפעת הסביבה עליה וחוסר התגובה לשינויים בסביבה מגדירים אותה מידית כגוף דומם. אך האם הסיווג פשוט כל כך וניתן להכללה לכל הגוף?

המושג הבסיסי המגדיר חיים הוא **הומויאוסטטוזיס**. ההומויאוסטטוזיס (הומו=דומה סטאוזיס=מצב) מגדיר את יכולתו של הגוף الحي לשמר על מצב הסביבה פנימית יציב ושוונה מהסביבה החיצונית. הגדרת ההומויאוסטטוזיס אינה שללת התרחשויות שינויים בסביבה הפנימית שמקורם בסביבה החיצונית. היצור الحي מתקיים בקשר הדוק עם סביבתו החיצונית, מקבל ממנה חומרים ופולט אליה חומרים ואנרגיה שמקורם בסביבה הפנימית. יכולת homoיאוסטטואית זו של היצור الحي נשמרת הוודות לשילוב מערכות ומבנה פנימיים המבאים לכינסה ברורנית של חומרים אל תוך היצורandi, עיבוד ושינוי החומרים הנקלטים והתאמתם לסביבה הפנימית והפרשה ברורנית של חומרים זהה אל הסביבה החיצונית. שלושת המרכיבים האלה (קליטה ברורנית, עיבוד פנימי והפרשה ברורנית) צורכים, רובם, אנרגיה מהיצורandi והמנעים את מצב שווון האנרגיה והחומרה בין לבין הסביבה החיצונית העוטפת אותו.

מצב homoיאוסטטוזיס יכול להתקיים גם במערכת סגורה. לאחר שמערכת זו אינה קולעת או פולעת חומרים לסביבה החיצונית, נמנע כל שינוי בסביבה הפנימית של המערכת. היצורandi יכול להתקיים כמערכת סגורה לאחר שהוא חלק מן הסביבה העוטפת אותו. אטימה מוחלטת שלו לסייעת החיצונית תביא להפסקת כל התהליכים המגדירים אותוandi.

על מנת לפשט את הבדיקה בין גופים חיים לדוממים הוגדרו **ששת מאפייני החיים**. מאפיינים אלה, כמקשה אחת, מאפיינים אך ורק יצורים חיים ואינם קיימים בגופים דוממים. אין פירוש הדבר כי גוף העומד באחד מאפייני החיים מוגדר כיצורandi, על מנת להיות מוגדר ככזה, עליו לעמוד בכל חמישה מאפייני החיים.

1. **הומויאוסטטוזיס**. שמירה על סביבה פנימית יציבה, פחות או יותר, ושוונה מהסביבה החיצונית, למרות השינויים החלים בסביבה החיצונית. הסביבה החיצונית מפעילה על הגוףandiichi כוחות רבים היכולים להביא לסתיטה במצב homoיאוסטטוזיס. על מנת לשמור את מצבו, מפעיל היצורandiichi שרשורת תהליכי פיזיולוגיים המבאים לתיקון מצבו ולביטול הסטייה.

2. **מבנה תא** יחידת המבנה המאורגןת הבסיסית של כל יצורandiichi היא התא. התא אינו קיים בגופים שאינם חיים עקב מרכיבותו. לתאים גדלים, צורות ואפילו מבנים שונים המותאימים לתפקידם ביצורandiichi הרב-תאי ו/או לsembיה בה הם חיים. למרות המגוון הרחב הנגלה לנו בהתבוננות עלולים התאים ניתנים להבחין במבנה מסוים זהה המאפשר את קיום homoיאוסטטוזיס : קרום ברוני, סביבה פנימית נזילה, מערכת להפקת אנרגיה, מידע תורשתי המוצפן בצווף תורשתי זהה, מערכת לבנית חלבונים וחילוף חומרים המבוסס על פעילות אנזימטית.

ניתן לחלק את מגוון התאים הקיימים לשני סוגים :

תאים פרוקריוטיים הם תאי חידקים. המבנה הבסיסי של התאים הפרוקריוטיים הוא פשוט יחסית ואינו מכיל אברונים המוקפים בקרום (מייטוכונדריוון, קלורופלאסט וגרעין תא). לתאי החידקים דופן תא המגנה עליהם משינויים אוסמוטיים קיצוניים ו-DNA המצוי בцитופלטמה ללא ארגון בגרעין תא.

תאים אוקריוטיים הם תאי בעלי חיים, פטריות וצמחים. התאים האוקריוטים נחברים לתאים מפותחים יותר (בשיטת אבולוציונית) וזאת עקב קיומם של האברונים המוקפים בקרומים המגדירים ותוחמים תהליכי חיים. לתאי הצמח מבנה בסיסי זהה לזו של תאי בעלי החיים אך הם מכילים תוספות ייחודיות כדוגמת הצלורופלסט, החלולית ודופן תא.

3. **קיום מטבולייזם** באמצעות אנזימים. כל גוף חי כולל חומרים מהסביבה. החומרים הנקלטים מהסביבה עוברים שינויים: הם מתפרקם, ובנוי הבניין משמשות להרכבה של חומרים אחרים המרכיבים את הגוף החי או להפקת אנרגיה. תהליכי הפירוק וההרכבה של חומרים בגוף מתקימים הודות לפעולותם של אנזימים, והם מכונים בשם כולל חילוף חומרים או מטבולייזם.

4. **גידלה והתפתחות**. הייצור החי משתנה במהלך כל חייו. על אף הדמיון הכללי בין התינוק הנולד לאדם הבוגר, חלים במהלך חייו של האדם שינויים רבים ההפכים אותו לモתאם לשלביו החיים השונים שלו. התבגרות מינית, השרת שיער הפרווה ביונקים מסוימים בקייז ועוד מהווים דוגמה לביטוי גנים או השתקתם לאורך חייו היוצר החי. בחרקים ובדו-חיים ניתן למצוא "קפיצות" התפתחותיות גדולות גם לאחר ההתפתחות העוברית: למשל הפיכת הזחל לבוגר מלאה בשינויים התפתחותיים משמעותיים.

5. **תגובה לגירויים** הסבירה החיצונית מפעילה, ללא הרף, גירויים על הייצור החי. גירויים אלה מקורם בגורמים המהווים איום על קיומו של הייצור החי (חשוב כיצד תחשש בשימושם של רעם אדייר) או לחילופין גורמים הנחוצים לקיומו של הייצור החי. על מנת להגיב לשינויים החליטו בסביבתו מכיל הייצור החי חישנים הבודקים את סביבתו ומזהים שינויים בה. זיהוי שינוי מוגדר כגירוי והיצור החי מגיב לשינוי בתיקונו מצבו. דוגמאות לגירויים ותגובה אליהם ניתן למצוא בשפע בכל עולם החיים: צמח הגדל לכיוון האור, לטאה הבורחת מגע בה, חידקים המעבירים ביניהם מידע תורשתי עם שינוי רמת החומציות בסביבתם ועוד.

6. **רבייה ותורשה** משמעותם שינוי העוברים על הייצור החי במהלך חייו אשר מטרתם העברת המידע התורשתי של הייצור החי אל הדור הבא ובכך להבטיח את המשכיות החיים. המידע התורשתי, המוצפן ב-DNA, מוכפל בזרה מדויקת בטרם תחיליך הרבייה ובכך נשמר הדמיון התורשתי בין ההוראה לצאצא.

רבייה זוויגית היא צורת רבייה בה הצעאה נוצר מעירוב מידע תורשתי של שני פרטיהם ולפיכך אין הוא זהה לפחות אחד מהם, אולם דומה לשניים. צורת רבייה זו מאפשרת יצירת פרטיהם חדשים השונים מהוריהם ולכן יכולים להיות מותאמים יותר לסביבה המשתנה.

רבייה אל-זוויגית אינה מעורבת שני פרטים ומהוות שכפול של פרט בודד. הרבייה האל-זוויגית היא מהירה יותר מהרבייה הזוויגית. יתרונה הגדל של הרבייה האל-זוויגית הוא בסביבה קבועה יחסית. עקב הזהות בין ההוראה היחיד לצאצא, יהיה הצאצא מותאם (או לא מותאם) לתנאי הסביבה בדיקוק כמו ההוראה.

החריג מבין היצורים החיים הוא **הנגיף** (וירוס). הוירוס הוא טיפול תוך תא אשר אינו יכול להתקיים ללא קיומו של תא מאכسن. הנגיפים שונים מכל היצורים החיים בכך שאינם עומדים באף אחד מסימני החיים בצורה עצמאית, דבר המעיד סימן שלאה סביב הגדרתם כיצורים חיים. מבנה הנגיף אינו תא וمبוסס על חומצת גרעין (DNA או RNA) העוטפה במעטפת חלבונית. לעיתים קיימים בוירוס גם מספר אנזימים ייחודיים אך אלה אינם פעילים מחוץ לתא המאכسن. רק לאחר החדיה והשתלבות בתא המאכسن מסוגל הנגיף לנצל את המנגנונים התוך-תאים של התא לצורך רבייתו.

מקורות של הנגיפים אינם ברור. קיימות תיאorias הטוענות כי התפתחותם של הנגיפים מקורה בתאים אשר עברו נסיגה לUMB של טפילות מוחלטת ואחרות הטוענות כי התפתחו מוחדרים אורגניים אשר עברו ארגון ושינויו במצב זה. בכל אחת משתי התיאorias ברור כי הנגיפים, בזרמת הנוכחית, לא יכולים להתפתח בתקופה מוקדמת זו בה התפתחו התאים הראשונים לאחר שמחזור חייהם מחייב את קיומם של תאים מאכSENS.

1. חלק מן המודענים אינם מגדירים את הנגיף כיצור חיו. הסיבה לכך היא
 - א. הנגיף קטן מאוד.
 - ב. הנגיפים אינם מכילים מידע תורשתי.
 - ג. הנגיפים אינם מבצעים פעולות חיים באופן עצמאי.
 - ד. הנגיפים הם טיפילים תוך תאיהם.
2. מבנה והרכבת החלבונים הtout תאים שונות מזו של החלבונים המצויים מחוץ לתא. עובדה זו מהוות דוגמה
 - א. להומיאוסטאזיס המתקיים בתא.
 - ב. לקיומו של מידע תורשתי ביצור החיה.
 - ג. להשפעת הסביבה על פעילות התא.
 - ד. תשובות א-וב נוכנות.
3. דיליקה פרצה בנקודה אחת והתפשטה בכל רחבי הבית. בדרך כלל האש רהיטים העשויים מעץ ונוצר עשן ופיה. מעובדה זו אנו מסיקים כי האש
 - א. היא יוצר חיו המקיים את סימן התרבותות.
 - ב. אינה יוצר חיו מאחר שההתפשטות אינה התרבותות.
 - ג. היא יוצר חיו מאחר שהיא מקיימת את סימן חילוף החומרים.
 - ד. אינה יוצר חיו מאחר שהיא אינה מקיימת את כל חמישת סימני החיים.
4. לאחר גיל התבגרות הפסיק יוסי לגבואה. חברי טען כי הפסיק לקיים את סימן החיים "גדייה והתפתחות" ולכן איןו יוצר חיו.
 - א. החבר טועה. ההסביבה הפנימית בגופו של יוסי משתנה ולכן קיימת התפתחות.
 - ב. החבר טועה. יוסי עדין מקיים חלק מסוימי החיים.
 - ג. החבר טועה. העובדה שיווסי נע מראה כי הוא חי.
 - ד. החבר צודק. יוסי אינו עומד בהגדרות הטכניות של חיים.
5. איזה מהמשפטים הבאים הוא דוגמה להומיאוסטאזיס?
 - א. התאית אינה מתפרקת במערכת העיכול של האדם.
 - ב. בתהילך השריפה קטן ריכוז החמצן באוויר.
 - ג. אנזימים נהרסים בטמפרטורה גבוהה.
 - ד. עליית טמפרטורת הגוף מלאוה בהזעה.
6. המשותף לנגיפים ולתאי בעלי חיים
 - א. שניהם בניוים מותאים.
 - ב. לשניהם קרום בררני.
 - ג. לשניהם חומר תורשתי.
 - ד. שניהם מקיימים מטבוליזם באמצעות אנזימים.

7. בתא נמצאו דופן, קרום ברני וציטופלסמה. סביר להניח כי התא
 א. הוא תא של בעל חיים או צמח.
 ב. הוא תא צמח או חיידק.
 ג. הוא תא נגיף או חיידק.
 ד. יכול להיות שיר לכל יצור חי.
8. בעלי חיים וחידקים הם יצורים חיים. המשותף להם
 א. מעטפת חלבונית.
 ב. אנזימיים.
 ג. יכולת תנועה.
 ד. דופן תא.
9. סביר להניח כי יכולת חילוף החומרים האנזימטית (מטבוליזם) התפתחה לפני התא הראשון. הסיבה לכך היא
 א. התא אינו יכול לשמור על הומיאוסטזיס ללא חילוף חומרים (מטבוליזם).
 ב. בתא אין מרכיבים שמקורם בסביבה החיצונית.
 ג. האנזימים אינם יכולים להתפרק ללא תאיהם.
 ד. נגיפים אינם בניינים מתאימים ולכן אינם מכילים אנזימיים.
10. המאפיין את כל היצורים החיים:
 א. תהליכי אוסמוזה ודיפוזיה.
 ב. יכולת התרבות אל-זוויגית.
 ג. קיום מטבוליזם באמצעות אנזימים.
 ד. דמיון לסביבה החיצונית.
11. חילוף חומרים פירושן:
 א. הכנסת חומר מזון מהmundי לדם והוצאה פסולת.
 ב. הוצאה פחמן דו-חמצני והכנסת חמצן לבריאות.
 ג. פירוק או הרכבות תרכובות באמצעות אנזימים.
 ד. פירוק המזון במערכת העיכול.
12. ציטופלסמה ניתן למצוא
 א. בוירוסים חיידקים ופטריות.
 ב. בחידקים פטריות ובבעלי חיים.
 ג. בכל סוגי היצורים הבנויים מתאים.
 ד. רק בתאי בעלי חיים וצמחים.
13. כל היצורים החיים
 א. מפיקים אנרגיה כימית בעזרת אנזימים.
 ב. מפיקים אנרגיה כימית בעזרת חם.
 ג. מפיקים אנרגיה כימית בעזרת אור.
 ד. מפיקים אנרגיית אור וחם מאנרגיה כימית.

14. הומיאוסטזיס פירושן

- א. ייצור אנרגיה.
- ב. קליטת חומרים ופליטת פסולת.
- ג. קיומה של סביבה פנימית זהה לסביבה החיצונית.
- ד. קיומה של סביבה פנימית השונה מהסביבה החיצונית.

15. בתאים פרוקריוטיים ניתן למצוא

- א. ציטופלזמה אך לא קרום תא
- ב. קרום תא אך לא מיטוכונדריה.
- ג. מיטוכונדריה אך לא כלורופלאסט.
- ד. כלורופלאסט אך לא דופן תא.

1. **תשובה ג.** הוויסטים אינם מקיימים את אף אחד מסימני החיים. אין קשר בין גודל (תשובה א) או צורת חיים (תשובה ד) להגדרת חיים. תשובה ב שגיה מאחר שהם מכילים מטען תורשתי.
2. **תשובה ד.** הכנסת חומרים מהסביבה החיצונית ושינויים על ידי אנזימים הם חלק מההומיאו-סטטוזיס (תשובה א). המידע אודות מבנה האנזימים מקורו במטען התורשתי של התא (תשובה ב).
3. **תשובה ד.** על מנת להיות מוגדר כיצור חי חייב הגוף לעמוד בכל חממת סימני החיים.
4. **תשובה א.** גדיות והפתחות היוצר הרוב תאין אינה רק במאפיינים חיוניים אלא גם ברמה התאית: התרבות תאים, שינוי ביוכימי וכו'.
5. **תשובה ז.** ההזעה מורידה את טמפרטורת הגוף חוזרת לרמה התקינה. ללא ההזעה תעלה טמפרטורת הגוף ולא יתקיים הומו-סטטוזיס של הטמפרטורה.
6. **תשובה ג.** החומר התורשתי נימצא בכל יצור חי והוא המגדיר את גבולות תפוקודו.
7. **תשובה ב.** דופן תא נמצא בחידקים ובצמחים. לאחר שלא מצוי אף אחד מהאברונים המוקפים בקרום לא ניתן להגדיר למי מהם מדובר.
8. **תשובה ב.** האנזימים מאפשרים את חילוף החומרים (מטבוליזם) בתא ולכן הם נמצאים בתאי כל היצורים החיים.
9. **תשובה א.** האנזימים אחראים על חילוף החומרים (מטבוליזם) המוביל להומו-סטטוזיס. ללא הומו-סטטוזיס לא יתקיימו חיים.
10. **תשובה ג.** חילוף החומרים (מטבוליזם) בכל היצורים החיים מתקיים בעדרת פעילות אנזימטית.
11. **תשובה ג.** האנזימים הם מולקולות המשנות מולקולות אחרות ומחליות סוג מולקולות אחד באחר.
12. **תשובה ג.** קיומו של תא מחייב תנועת חומרים בין האברונים בדיפוזיה, תפקיד אותו ממלא היציטופלזמה.
13. **תשובה א.** האנרגיה האגורה במולקולות עתירות האנרגיה כדוגמת ה ATP היא המקור האנרגטי לכל התהליכים בתא. תהליכי הנשימה התאית, ככל התהליכים בגוף מבוצע על ידי אנזימים.
14. **תשובה ז.** הסבכה הפנימית היוצרת חיבור קבוע, בגבולות מוגדרים, ולא להיות מושפעת מהסביבה החיצונית.
15. **תשובה ב.** תאים פרוקריוטיים אינם מכילים אברונים העטופים בקרום תא. התא עצמו מוקף בקרום על מנת לשמר על הברונות.

תאים מסוגים שונים

מגוון היצורים החיים הקיימים בביוספרה הוא עצום. על חלק מן היצורים החיים ניתן לצפות ישירות ואילו יצורים אחרים מחיברים אמצעים שונים כדי לצפות בהם (זכוכית מגДЕת, מיקרוסקופ אוור ואפילו מיקרוסקופ אלקטרוני).

המגוון העצום של היצורים החיים מבוסס על קיומה של מערכת תאית בסיסית המקיימת את תהליכי החיים באמצעות אנטזימים. במהלך האבולוציה התפתחו התאים השונים, ככל הנראה, מתוך אב קדמון מסווג. התאים השונים מותאמים לתפקיד שהם ממלאים בגוף החיה וכל סוג תא בעל מבנים ייחודיים המקיים תהליכי ביולוגיים מסווג זה של תאים. עקב קיומן של מבנים ייחודיים אלה ניתן למצוא תאים הנראים שונים מאוד זה מזה, אך בחינה של תפקודם הבסיסי תראה את הדמיון העצום במבנה שלהם.

האברונים המשותפים לכל סוגי התאים :

- **קרום** ברכני הבניי בעיקר משומן וחלבוני. הברנות של קרום התא מאפשרת לשומר על סביבה פנימית השונה מן הסביבה החיצונית.
- כל התאים מכילים **נוול תוך-תאי** (цитופלטמה). מעבר החומרים בתוך התא מתקיים בדיפוזיה בנוול.
- **חומר תורשתי** (DNA ו-RNA) מאפשר מעבר מידע תורשתי מתא אם לתאי הבת.
- **ריבוזומים** המייצרים חלבונים בהתאם למיצוי החומי בתורשתי.

האברונים הייחודיים לסוגי תאים שונים :

- **דופן** תא מגנה על התא משינויים אוטומטיים. דופן התא קיימת בחידקים, פטריות וצמחים, אך החומרים הבונים את הדופן שונים בתאים השונים.
- **כלורופלט** קיים בתאים של צמחים, מאפשר יצירה של חומר אורגני מהחומר אנאורגני באמצעות אנרגיית האור המומרת לאנרגיה כימית.
- **MITוכונדריה** קיימת בתאים אוקריוטים בלבד, מפיקה את האנרגיה הכימית מן החומרים האורגניים.
- **גרעין התא** קיים בתאים אוקריוטים בלבד ובו מצוי החומר התורשתי.

תוספות ייחודיות לתאים שונים :

- **שוטון** היא תוספת המאפשרת תנוצה של תאים. השוטון נמצא בתאים בעלי יכולת תנועה כדוגמת תא זרע, חיידקים ועוד.
- **אקסונים** ו**דןדריטים** הם שלוחות המאפשרות העברת מידע עצבי דרך קרום התא.

תא בעל חיים	תא צמח	תא חיידק	
	קרום תא, ציטופלטמה, חומר תורשתי, ריבוזומיים		מרכיבים משותפים
אין דופן	חלק גדול של החיידקים ולתאי הצמחים יש דופן תא. ההבדל בין הקבוצות השונות הוא הרכיב הכימי של הדופן.		
מיוטוכונדריות וחומר תורשתי מוקף קרום : אוקריוטיים	אין מיוטוכונדריות או קרום סביבה הגרעין : פרוקריוטיים		
	כלורופלסטים וחלולית גדולה.		מרכיבי תא נוספים

תאים והיחס בין שטח הפנים לנפח

ארגוניים חד-תאים אינם מגיעים לגודל גדול ולרוב הם מיקרוסקופיים. הסיבה לכך היא שככל שగודל יותר, כך היחס בין שטח הפנים לבין הנפח שלו קטן יותר. ככל שתא קטן יותר, תוכן התא חשוב יותר לסייע החיצונית וכיוםקיימים עמה יחסי גומלין.

ביחס גדול של שטח פנים לנפח קיימים יתרונות רבים, אך גם חסרונות: קליטת החומרים ופיזורם בתא יהיה מהיר יותר בהתאם קטנים מאשר בתאים גדולים, אך גם איבוד חומרם ואנרגיות לסייע יהיה מהיר יותר. לתאים המקיים קשר הדוק מאוד עם הסביבה החיצונית שלהם, יחס גדול במיוחד בין שטח הפנים לנפחם. למשל, תא מעי הקולטים את תוצרי הפירוק במעי הדק אשר להם קרום מפוזל מאוד או תא דם אדום שלהם מבנה של דסקית שטוחה ודוח-קעורה.

דרישות מתוך תכנית הלימודים:

רעיון/תופעה	מפורט תכניות	מושגים ומושגים נוספים
ב תא מתקיימת סביבה מיינית. רוב החומרים הבוניים את תא היוצרים החיים הם תרכובות פחמן אורגניות מסווגים שונים. בתאים מצויים גם מינרלים.	היסודות העיקריים הבונים את התרכובות האורגניות הם מועטים (C, H, O, N, P, S), ואך על פי כן מגוון התרכובות בכל תא גודל מאוד. הרכיב והתכונות של פחמיות, ליפידים, חלבוניים, חומצות גרעין, חומרים אינאורגניים, חלבוניים, מאפיינים, דוגמאות בצמחים ובבעלי חיים חשיבות המים והמינרלים.	חד-סוכר, חומצות אמיניות, חומצות גרעין, חומרם אינאורגניים, חלבוניים, ליפידים, נוקלאוטידים, פחמיות, רב-סוכר, תאית, DNA, RNA, חומרם תשמורת: גליקוגן, עמילן, שומנים.

התא מורכב מחומרים אורגניים (הבנייהים של פחמן המחבר אליו מימן ולרוב גם יסודות אחרים) ואנאורגניים (שאיןם מכילים בהרכב המולקולות שלהם פחמן, חמצן ומימן בלבד).

בין חומרים האנאורגניים נכללים מים ומינרלים. חומרים האורגניים כוללים: חלבוניים, פחמיות, שומנים (ליפידים) וחומצות גרעין.

פחמן (C) הוא יסוד הנושא להתחבר בין עצמו וליצור שרשראות. שרשראות הפחמן מהוות את החלד של חומרים האורגניים. חומרם אורגניים שונים נבדלים בדרך הארゴן של אטומי הפחמן במולקולות (ארגון השרשראות והסתעפותן) וביסודות אחרים המתחברים אליו. **כל חומר אורגני מכיל גם מימן (H)** קשור לפחמן. נוסף על כך, מתחברים יסודות אחרים כמו חמצן (O), חנקן (N) בחלבוניים וחומצות גרעין, זרחן (P) בחומצות גרעין ו-ATP, גופרית (S) בחלבוניים. אלה, (C, H, O, N, P, S), הם היסודות העיקריים המרכיבים את החומרם האורגניים בתאים. השילובים השונים מהם יוצרים מרכיבים את המגוון העצום של המולקולות האורגניות בתא.

נוסף על אלה יש עוד יסודות המופיעים בכמויות קטנות יותר, כמו ברזל בהמוגלובין, מגנזיום בקלורופיל, יוד בהורמוןтирואקסין (המוסת את חילוף החומרם בגוף).

החומרים הבונים את התאים:

החומר	תפקיד					
חומריאם אנאורוגניים	<ul style="list-style-type: none"> • מהווים את רוב נפח התא. • קובעים את נפח התאים. • מספקים סבירה מתאימה להתרחשות של תגבות כימיות. • משתתפים בחלוקת מהתגבות הכימיות המתרחשות בתא. • ממייסים חומרים ומאפשרים את הובלתם למקום בתא. • מוחלים חומירי פסולת רעלילים. 	מים				
מינרלים	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px; text-align: center; vertical-align: top;">זרון</td> <td style="width: 50px; text-align: center; vertical-align: top;">חנקו</td> </tr> <tr> <td>מרכיב של הנוקליואוטידים המרכיבים את חומצות הגרעין וגם של ATP. חלק בלתי נפרד של הליפידים המרכיבים את קרום התאים (פוספוליפידיים).</td> <td>מרכיב של חומצות אמינוות המרכיבות חלבוניים ושל הנוקליואוטידים המרכיבים את חומצות הגרעין.</td> </tr> </table>	זרון	חנקו	מרכיב של הנוקליואוטידים המרכיבים את חומצות הגרעין וגם של ATP. חלק בלתי נפרד של הליפידים המרכיבים את קרום התאים (פוספוליפידיים).	מרכיב של חומצות אמינוות המרכיבות חלבוניים ושל הנוקליואוטידים המרכיבים את חומצות הגרעין.	
זרון	חנקו					
מרכיב של הנוקליואוטידים המרכיבים את חומצות הגרעין וגם של ATP. חלק בלתי נפרד של הליפידים המרכיבים את קרום התאים (פוספוליפידיים).	מרכיב של חומצות אמינוות המרכיבות חלבוניים ושל הנוקליואוטידים המרכיבים את חומצות הגרעין.					
 גופרית	מרכיב של מספר חומצות אמינוות המרכיבות את החלבוניים. לGOPRITY שבחומצות אמינוות אלה תפקיד חשוב בקביעת המבנה המרחבי של החלבוניים.					
נתון ואשלגן	חשיבותם לקביעת הלחץ האוסמוטי של התאים ולמעבר הדחף העצבי באקסונים של תא העצב.					

מבנה	תפקיד	החומר
חד-סוכר	<ul style="list-style-type: none"> • מספקות אנרגיה לטוחה קצר. • נאגרות לטוחה רחוק יותר בכבד ובשריר בצורת רב-סוכר, גליקוגן. • מרכיבות אנטיגנים (מולקולות המאפשרות זיהוי עצמי מול זר) והדבק הבין-תאי הקשור את התאים של רקמה מסוימת ביחד. 	חמיימות
חומצות שומן וגליצרול.	<ul style="list-style-type: none"> • לlipidim תפקידים חשובים בתא: בנייה קרומי התאים וקרומי במדוראים השונים בתא. • אגירה של אנרגיה מרוכזת. • בקרה על פעילות התאים (פעילות הורמונאלית - הורמוניים סטראודים). 	שומנים

מבנה	תפקיד	החומרים
	<p>לחלבונים תפקידים שונים ומגוונים :</p> <ul style="list-style-type: none"> • אণזימים מזרזים תהליכי חיים ייחודיים בתא. • חומר בניין, כמו קרטין (החומר המרכיב שיעור וציפורניים), קולגן (חומר המצויב ברקמות חיבור). • קישור ייחודי של מולקולות, כמו נוגדים. • נשאים ייחודיים המאפשרים מעבר של מולקולות דרך קרום התא או נשיאת חמצן בזרם הדם (המוגלובין). • תנואה, כמו אקטין ומיזין בתאי שריר, או בשוטון של תא זרע. • אוטות, כמו הורמוניים וגורמי גידול. למשל אינסולין המווסת את רמת הגלוקוז בدم. • נוירוטרנסmitterים המעבירים אותן במערכת העצבים. • רעלים ורעלניות. • צבענים כמו מלנין וכולורופיל. 	חלבונים
נוקליאוטידים	אכסון מידע תורשתי (דנ"א ורנ"א).	חומצות גרעין

פחמיימות

חד-סוכר הוא אבן הבניין של הסוכרים (פחמיימות). חד-סוכרים מופיעים בהתאם כיחידות (גלוקווז למשל) או מתחברים למולקולות גדולות יותר, כמו דו-סוכרים או **רב-סוכרים** (תאית, עAMILן וגליקוגן), המורכבים מחיבור של יחידות רבות של חד-סוכרים).

גלוקווז משמש הן כאבן בניין של התא שמננו נבנים חומרים ארגניים אחרים והן כחומר גלם להפקת אנרגיה זמינה לתאים.

התאית היא מולקולה המורכבת מיחידות גלוקווז רבות הקשורות ביניהן בקשר אופייני. בעלי חיים חסרי אণזימים לפירוק התאית ועל כן התאית אינה מתעכלה בגופם, אלא אם כן הם חיים בסימביוזה עם חיידקים מפרקית תאית, כמו מעלי הגירה.

התאית מרכיבה את דופן תא הצמחים ומקנה לתאים אלה הגנה פיזית.

התאית נכללת בין הסיבים התזונתיים שאינם מתעכלים בגופנו, אך יש להם תפקיד בהסדרת פעילות מערכת העיכול ובהורדת רמת הcolesterol בדם.

חלבוניות

מולקולות המורכבות מיחידות מבנה: **חומצות אמינוות**. עשרים סוגים שונים של חומצות אמינוות מרכיבים את החלבונים. לכל חלבון יש הרכב ייחודי של חומצות אמינוות (מספר החומצות האמינוות והסוג) המסוודרות ברצף המאפיין רק אותו. רצף זה (מבנה הראשוני של החלבון) קובע את הדרך שבה שרשרת החומצות האמינוות תתקפל למרחב ומתוך כך את התפקיד של החלבון.

לחלבונים תפקדים רבים בתאים, כפי שמתואר בטבלה.

ליפידים

הליפידים הם מולקולות המורכבות מיחידות המבנה **חומצות שומן וגליצרול**. ליפידים מרכיבים את קרום התאים (פוספוליפידים) ומיצבים אותו. לפוספוליפידים של קרום התא תפקיד חשוב בהפרדה בין הסביבה המימית התוך-תאית לבין הסביבה המימית החיצונית לתא.

ליפידים אחרים משמשים כחומר נשמר לאגירת אנרגיה לטוווח רחוק.

חומצות גרעין

הן מולקולות הנוצרות בגרעין התא. חומצות הגרעין כוללות את ה-DNA הנושא את המידע התורשתי ומוצי בכרומוזומים שבגרעין התא, ואת מולקולות RNA הנוצרות בגרעין אך פועלות בцитופלטמה ולהן תפקיד בתרגום המידע התורשתי שבדן"א לחלבונים.

חומצות הגרעין מורכבות מיחידות מבנה - **הנוקליואטידים**.

כל נוקליואטיד מורכב מסוכר, קבוצה זרחנית (המכילה זרחן) ובסיס חנקני (המכיל חנקן). חמישה סוגי שוניים של נוקליואטידים מרכיבים את מולקולות חומצות הגרעין, הנבדלים (סוגי הנוקליואטידים) בסיס החנקני שהם מכילים. המידע התורשתי ("מתקנים" לייצור חלבונים הקובעים את התכונות)-agor ברכפים שונים של נוקליואטידים. רצפים אלה מתורגםים לרצפים של חומצות אמינוות המרכיבות את החלבונים השונים.

חומי תשמורת: גליקוגן, עמילן, שומנים.

חומי תשמורת הם חומרים הנאגרים בתאים לשימוש עתידי לצרכים שונים של התאים: כחומי גלם לבניית חומרים אחרים או להפקת אנרגיה.

המאפיין החשוב של חומי התשמורת הוא שהומרים אלה **אין מסויסים** במים. לכן, ניתן לאגור אותם בכמויות גדולות מבלי לשנות את הריכוז האוסmotiy של התאים וambil שתהיה סכנה של חדירה מוגברת מדי של מים העולה לגורם לפיצוץ התאים.